

NCSS PLAN DE ACCIÓN PARA CONVULSIONES

Este estudiante está siendo tratado por un trastorno convulsivo. La siguiente información debería ayudarle si se produce una convulsión durante el horario escolar.

Nombre del Estudiante: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Nombre del Padre/Madre/ Tutor: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Otro Contacto de Emergencia: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Proveedor de Tratamiento: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Historial médico relacionado: _____

Medicamentos actuales: _____

Describa cualquier consideración o precaución especial (con respecto a las actividades escolares, deportes, viajes, etc.): _____

Protocolo específico para estudiantes

**Información requerida*

Tipo de convulsión	*Duración	*Frecuencia	*Descripción

*Desencadenantes de convulsiones o señales de advertencia.

*Respuesta del estudiante después de una convulsión:

Medicamentos de Emergencia

Valtoco y Nayzilam (Intranasal)

Medicamento	Dosis	La dosis se puede repetir _____ veces después de:	Dosis Máxima

Diastat (supositorio)

Medicamento	Dosis	La dosis se puede repetir _____ veces después de:	Dosis Máxima

***Instrucciones de llamada EMS:** _____

Zona Verde Menos de 2 minutos	Zona Amarilla 2 a 5 minutos	Zona Roja Mas de 5 minutos o mas de 3 convulsiones en una una hora
<ul style="list-style-type: none"> Comience primeros auxilios para la convulsion Observe de cerca al estudiante hasta que se recupere de la convulsion Notifique al pade/madre, o tutor Regrese al estudiante a clases 	<ul style="list-style-type: none"> Continue los primeros auxilios para la convulsion Preparesse para administrar el medicamento Diastat/Versed Observe al estudiante de cerca hasta que se recupere Notifique al padre/madre, o tutor El estudiante puede regresar a la clase o irse a la casa dependiendo de lo que indiquen los padres o el tutor 	<ul style="list-style-type: none"> Continue los primeros auxilios para la convulsion Administre Diastat/Versed Monitorear la respiracion y el ritmo cardiaco y comience CPR si se necesita Notifique al padre/madre/tutor Llame al 911 si la convulsion dura mas de 7 minutos

Primeros Auxilios Basicos para Covulsiones	Una convulsion generalmente se considera una emergencia cuando:
<ul style="list-style-type: none"> Mantenagase calmado y lleve la cuenta del tiempo Mantenga al niño (a) seguro (a) No restringir al niño (a) No ponga nada en la boca del niño (a) Documente la convulsion en una hja de registro Quedese con el niño (a) hasta que recupere la conciencia completamente <p>Para Convulsiones "Tonic-Clonic"</p> <ul style="list-style-type: none"> Proteja la cabeza Mantenga las vias respiratorias abiertas/ Observe la respiracion Voltear al ninño de lado 	<ul style="list-style-type: none"> La convulsion (Cronic-tonic) dura mas de 5 minutos El estudiante experimenta convulsiones repetidas sin recobrar el conocimiento El estudiante se lastima o si tiene diabetes El estudiante tiene una convulsion por primera vez El estudiante tiene dificultad para respirar El estudiante tiene una convulsion mientras esta en el agua

Nombre impreso del proveedor: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Nombre Impreso del Padre/ Madre/ Tutor: _____ Firma: _____ Fecha _____